

Условие

Разложить функцию $y(x) = x^2 \ln(4 + x^2)$ в ряд Маклорена и найти радиус сходимости R полученного ряда.

Решение

$$y(x) = x^2 \ln(4 + x^2) = x^2 \ln \left(4 \cdot \left(1 + \frac{x^2}{4} \right) \right) = x^2 \ln 4 + x^2 \ln \left(1 + \frac{x^2}{4} \right)$$

Так как $\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}$ при $z \in (-1; 1]$, то подставляя $z = \frac{x^2}{4}$, получим:

$$y(x) = x^2 \ln 4 + x^2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\left(\frac{x^2}{4} \right)^n}{n} = x^2 \ln 4 + x^2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n}}{4^n \cdot n} = x^2 \ln 4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot x^{2n+2}}{4^n \cdot n}.$$

Полученное разложение верно при $-1 < \frac{x^2}{4} \leq 1$, $x^2 \leq 4$, $-2 \leq x \leq 2$. Следовательно, радиус сходимости $R = 2$.

Ответ: $y(x) = x^2 \ln 4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot x^{2n+2}}{4^n \cdot n}, -2 \leq x \leq 2.$