

Условие


Найти $\iint_S x^2 y^2 dq$, где S – полусфера $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$.

Решение

$$z'_x = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad z'_y = -\frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

$$dq = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dxdy = \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{R^2 - x^2 - y^2}} dxdy = \frac{R dxdy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

В проекции на плоскость Oxy получим область D , ограниченную окружностью $x^2 + y^2 = R^2$ с центром в начале координат и радиусом R . В полярной системе координат уравнение окружности будет таким: $\rho = R$.



Для области D получим: $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $0 \leq \rho \leq R$.

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 y^2 dq &= R \cdot \iint_D \frac{x^2 y^2 dxdy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} = R \cdot \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \frac{\rho^5 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} d\rho = R \cdot \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^R \frac{\rho^5 d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = \\ &= R \cdot \int_0^{2\pi} (\sin \varphi \cos \varphi)^2 d\varphi \int_0^R \frac{\rho^5 d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = \frac{R}{4} \cdot \int_0^{2\pi} \sin^2 2\varphi d\varphi \int_0^R \frac{\rho^5 d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = \frac{R}{8} \cdot \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\varphi) d\varphi \int_0^R \frac{\rho^5 d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = \\ &= \frac{R}{8} \cdot \left(\varphi - \frac{\sin 2\varphi}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} \cdot \int_0^R \frac{\rho^5 d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = \frac{\pi R}{4} \cdot \int_0^R \frac{\rho^5 d\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = -\frac{\pi R}{8} \cdot \int_0^R \frac{\rho^4 d(R^2 - \rho^2)}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = \\ &= -\frac{\pi R}{8} \cdot \int_0^R \frac{(R^2 - \rho^2 - R^2)^2 d(R^2 - \rho^2)}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} = \left[\begin{array}{c|c|c} t = R^2 - \rho^2; \\ \rho & 0 & R \\ t & R^2 & 0 \end{array} \right] = -\frac{\pi R}{8} \cdot \int_{R^2}^0 \frac{(t - R^2)^2 dt}{\sqrt{t}} = \\ &= \frac{\pi R}{8} \cdot \int_0^{R^2} \frac{t^2 - 2tR^2 + R^4}{\sqrt{t}} dt = \frac{\pi R}{8} \cdot \int_0^{R^2} \left(t^{\frac{3}{2}} - 2R^2 t^{\frac{1}{2}} + R^4 \cdot t^{-\frac{1}{2}} \right) dt = \frac{\pi R}{8} \cdot \left(\frac{2t^{\frac{5}{2}}}{5} - \frac{4R^2 t^{\frac{3}{2}}}{3} + 2R^4 \cdot t^{\frac{1}{2}} \right) \Big|_0^{R^2} = \frac{2\pi R^6}{15}. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{2\pi R^6}{15}$.